



Aracmyn Plus

Faboterápico Polivalente Antiarácnido



PRODUCTO

ARACMYN Faboterápico Polivalente Antiarácnido

Antídotos



BIODIAGNOSTICOS

INNOVACIÓN CLÍNICA INTEGRAL



Antivipmyn (Antídoto Faboterápico Polivalente)

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

Liofilizado para solución inyectable se presenta en caja 1 frasco ampula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente.

El frasco ampula con liofilizado contiene:

Faboterápico polivalente antiarácido modificado con digestión enzimática y libre de albúmina con una capacidad neutralizante

de: **600 DL** **6000 DL**
(120 glándulas **(180 glándulas**
de veneno de arácido. Una dosis)

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La vía de administración es intravenosa.

Reconstitución para su aplicación:

Prepare los frascos ampula que requiere el paciente de la siguiente manera:

1. Retire la tapa Flip-off del frasco ampula .
2. Con un algodón humedecido con alcohol, limpie el tapón de hule que queda al descubierto.
3. Abra la ampolleta con el diluyente y con una jeringa y aguja estéril (se recomienda una jeringa con capacidad de 10 ml), saque el líquido contenido e inyéctelo en el frasco ampula a través del tapón de hule.
4. Retire la jeringa del frasco ampula.
5. Agite suavemente con movimientos rotatorios hasta disolver completamente la pastilla. Evite agitación vigorosa o prolongada. Debido al contenido proteico del antiveneno, se puede formar espuma durante el proceso de reconstitución. La solución debe ser translúcida o ligeramente opalescente.
6. Vuelva a introducir la aguja con la jeringa en el tapón de hule del frasco ampula, y saque la totalidad de la solución contenida en el frasco ampula.
7. Una vez extraída la solución del frasco ampula, retire la aguja con la jeringa del frasco ampula.
8. Repita los pasos anteriores para abrir y preparar los frascos de que se requieran.
9. Afore reconstituido a 250 ml de solución fisiológica y adminístrelo en 30 minutos aproximadamente.
10. Para la administración de las dosis de sostén repita el procedimiento. De acuerdo con el grado de intoxicación se sugiere el siguiente esquema posológico:

Grado de intoxicación	Síntomas y signos	Grupo de edad	Dosis
Leve o Grado 1	Dolor en el sitio de la mordedura, dolor de intensidad variable localizado en miembros inferiores o región lumbar o abdomen o en los 3 sitios, diaforesis, sialorrea, astenia, adinamia, mareo, hiperreflexia.	Cualquier Edad	1 Frasco IV
Moderado o Grado 2	Signos y síntomas del cuadro leve más acentuados y además: disnea, lagrimeo, cefalea, opresión torácica, rigidez de las extremidades, espasmos musculares, contracturas musculares, priapismo.	Menor de 15 años Mayor de 15 años	2 Frasco IV 1 a 2 Frascos IV
Severo o Grado 3	Signos y síntomas del cuadro moderado más acentuados y además: midriasis o miosis trismus, confusión, delirio alucinaciones, retención urinaria, arritmias, taquicardia. o bradicardias, broncoconstricción, rigidez muscular generalizada.	Menor de 15 años Mayor de 15 años	3 Frasco IV 2 a 3 Frascos IV

El cuadro clínico remite en promedio entre 90 y 120 minutos después de la administración de ARACMYN PLUS; si no hay mejoría clínica, repetir la dosis inicial.